

# Medizinische Dokumentationsassistenten

## Ambulante ICD-10-GM-Kodierung

### Innere Medizin (2)

---

11. Ein Patient leidet infolge seiner langjährigen Hypertonie sowohl unter einer Herzinsuffizienz im Stadium NYHA III als auch unter einer chronischen Niereninsuffizienz im Stadium 2. ( *3 Kodierungen* )
12. Eine 74jährige Patientin kommt zur Kontrolle und Verordnung der notwendigen Medikamente in die Praxis. Sie hat einen primären Hypertonus und Linksherzinsuffizienz (NYHA II). Gleichzeitig hat sie eine KHK ohne hämodynamisch wirksame Stenosen. Eine beginnende Niereninsuffizienz (Stadium 1) wurde durch Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate vor drei Monaten festgestellt. ( *4 Kodierungen* )
13. Bei einem Patienten erfolgt wegen akuter präkordialer Schmerzen eine komplexe kardiologische Abklärung zum Ausschluss eines Herzinfarktes. Dabei werden eine instabile Angina pectoris und eine koronare Zwei-Gefäß-Erkrankung gesichert. ( *3 Kodierungen* )
14. Ein Patient mit bekannter instabiler Angina pectoris und koronarer Zwei-Gefäß-Erkrankung stellt sich in der Praxis mit heftigen präkordialen Schmerzen vor. Zum Ausschluss eines akuten Herzinfarktes erfolgt sofort eine komplexe kardiologische Abklärung. Dabei zeigen sich im EKG eindeutige Infarktzeichen im Vorderwandbereich. Umgehend wird der Patient erstversorgt und die stationäre Behandlung im Krankenhaus veranlasst. ( *3 Kodierungen* )
15. Ein 60jähriger Patient ohne spezifische Beschwerden stellt sich in einer Praxis zur Beratung für die Früherkennung von Darmkrebskrankheiten vor. Bei der anschließend durchgeführten Koloskopie findet sich kein pathologischer Befund. ( *1 Kodierung* )
16. Bei einer präoperativen Routineuntersuchung findet sich im Blutbild eine mikrozytäre Anämie. Die weitere Diagnostik ergibt eine Eisenmangelanämie. ( *1 Kodierung* )
17. Ein 68jähriger, adipöser Patient (BMI 35) mit einer beidseitigen Leistenhernie stellt sich in einer Praxis zur Abklärung der OP-Indikation vor. Anamnestisch ist bei dem Patienten eine arterielle Hypertonie mit Herzinsuffizienz und ein Diabetes mellitus Typ 2 mit Retinopathie bekannt. ( *5 Kodierungen ; Kreuz-Stern* )
18. Ein Patient mit Hämophilie A kommt im betreffenden Quartal nur in die Praxis, um sich ein Rezept für die Substitution des Gerinnungsfaktors VIII abzuholen. Das Rezept wird von der Arzthelferin erstellt, ohne dass es zu einem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt kommt. ( *2 Kodierungen* )

# Medizinische Dokumentationsassistenten

## Ambulante ICD-10-GM-Kodierung

### Innere Medizin (2)

---

19. Ein 68jähriger Patient stellte sich in der Praxis mit einem 9 x 12 cm großer Tumor am Rücken vor, klinisch, sonographisch und kernspintomographisch am ehesten ein Lipom, eine maligne Entartung ist nicht auszuschließen. Bisher erfolgte keine Exzision oder Biopsie zur histologischen Untersuchung. Der Patient kommt zur Besprechung des weiteren Vorgehens. ( *1 Kodierung* )
  
20. Ein 12jähriger Patient mit bekanntem allergischem Asthma bronchiale kommt mit den Symptomen einer Pneumonie in die Praxis. Im Sputum werden Hämophilus-Erreger nachgewiesen. ( *4 Kodierungen* )