

Medizinische Kodierassistenten

Kodierung im stationären Bereich

Psychiatrie und Psychosomatik (3)

Fall 21

Ein 63jähriger Patient mit einer Demenz bei Alzheimer-Krankheit wird stationär zur Abklärung aufgenommen.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Fall 22

Ein Patient wird mit optischen Halluzinationen stationär aufgenommen. Die erste Untersuchung lassen es noch nicht zu, eine Diagnose zu stellen. Da der Patient bereits am 2.Tag das Krankenhaus auf eigenen Wunsch gegen Ärztlichen Rat verlässt, kann die Diagnostik auch nicht abgeschlossen werden. Eine spezifische Behandlung wurde nicht durchgeführt.

Hauptdiagnose:

--

Fall 23

Eine 65jährige Patientin mit langjähriger Panikstörung und Benzodiazepinabhängigkeit kommt zur stationären Aufnahme. Vom 58. – 60.Lebensjahr fand eine ambulante Psychotherapie mit vollständiger Remission statt. Vor 6 Monaten verstarb nach 30jähriger Ehe ihr Ehemann. Danach entwickelte die Patientin eine depressive Symptomatik mit Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und gedrückter Stimmung. Nachdem in den letzten Wochen Suizidgedanken hinzukamen, ohne dass die Panikstörung erneut exazerbierte, wurde sie von ihrem niedergelassenen Arzt zur stationären Behandlung eingewiesen.

Hauptdiagnose:

--

Fall 24

Vollstationäre Behandlung eines 40jährigen mit Adipositas Grad III und starken Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ in der Erwachsenenpsychiatrie.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Medizinische Kodierassistenten

Kodierung im stationären Bereich

Psychiatrie und Psychosomatik (3)

Fall 25

Vollstationäre Behandlung eines 40jährigen mit schweren Depressionen wegen Adipositas Grad III in der Erwachsenenpsychiatrie.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Fall 26

Vollstationäre Behandlung eines 40jährigen mit Persönlichkeitsstörungen vom Borderline-Typ in der Erwachsenenpsychiatrie und Adipositas Grad III ; als somatische Komorbidität besteht eine Multiple Sklerose.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose 1:

--

Nebendiagnose 2:

--

Fall 27

Vollstationäre Behandlung eines 60jährigen mit schwerer Depression ohne psychosomatische Symptome in der Erwachsenenpsychiatrie. Als somatische Komorbidität besteht ein Diabetes mellitus Typ 2 ohne Komplikationen. Im Verlauf werden Stoffwechselentgleisungen des Diabetes diagnostiziert, denen mit Hilfe der konsiliarisch hinzugezogenen Internisten mittels Therapieanpassung begegnet wird.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose 1:

--

Fall 28

33jähriger Patient mit massivem Verfolgungserleben und Stimmenhören. Es handelt sich um die 3.stationäre Aufnahme. Das Erleben besteht seit 3 Monaten, nachdem er 2 Monate zuvor seine neuroleptische Medikation abgesetzt hat.

Hauptdiagnose:

--

Medizinische Kodierassistenten

Kodierung im stationären Bereich

Psychiatrie und Psychosomatik (3)

Fall 29

Patient mit einer organisch bedingten Persönlichkeitsstörung wird in der Erwachsenenpsychiatrie vollstationär aufgenommen.

Hauptdiagnose:

Fall 30

Ein 63jähriger Patient mit einer Demenz bei Alzheimer-Krankheit wird stationär zur Abklärung aufgenommen.

Hauptdiagnose:

Nebendiagnose: