

Medizinische Kodierassistenten

Kodierung im stationären Bereich

Psychiatrie und Psychosomatik (4)

Fall 31

55jähriger Patient mit einer Demenz bei neurodegenerativer Erkrankung, welche den Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns zerstört.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Fall 32

Ein Patient wird wegen einer akuten Mischintoxikation stationär aufgenommen. Die Intoxikation manifestiert sich als aggressiv-agitiertes Verhalten, Gang- und Standunsicherheit, Miosis sowie verwaschene Sprache.

Zum aktuellen Zustandsbild führte, dass sich der Patient mehrfach Heroin gespritzt und exzessiv Alkohol konsumiert hatte. Zusätzlich hat der Patient verschiedene "Pillen" eingenommen, von denen er jedoch nicht wisse, um welche Substanzen es sich handelte. Während des stationären Aufenthaltes wird die vorbestehende Substitutionsbehandlung mit Methadon fortgesetzt.

Nach unkomplizierter Detoxifikation wird eine Motivationsbehandlung zur problemspezifischen Weiterbildung des Alkohol- sowie Opioid-Abhängigkeits-syndroms durchgeführt.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose 1:

--

Nebendiagnose 2:

--

Nebendiagnose 3:

--

Nebendiagnose 4:

--

Nebendiagnose 5:

--

Nebendiagnose 6:

--

Prozedur:

--

Fall 33

Ein Patient wird wegen einer Hypothyreose nach Thyreoidektomie vor einem Jahr stationär aufgenommen.

Hauptdiagnose:

--

Medizinische Kodierassistenten
Kodierung im stationären Bereich
Psychiatrie und Psychosomatik (4)

Fall 34

Ein Herzschrittmacherträger wird wegen einer Elektrodendislokation stationär aufgenommen.

Hauptdiagnose:

--

Fall 35

Ein Patient wird nach vorangegangener Behandlung einer Fersenbeinfraktur nun wegen einer tiefen Beinvenenthrombose stationär aufgenommen.

Hauptdiagnose:

--

Fall 36

Ein Patient wird wegen eines akuten Rausches bei bekannter Alkoholabhängigkeit aufgenommen.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Fall 37

Bei einem Patienten wird eine alkoholbezogene Entzündung der Speiseröhre diagnostiziert.

Hauptdiagnose:

--

Nebendiagnose:

--

Fall 38

Ein Patient wird stationär mit einer Chemotherapie (3 Tage, 2 Medikamente) bei metastasierendem Karzinom parallel mit einer epidurale Schmerztherapie als alleinige therapeutische Maßnahme behandelt.

Prozedur 1:

--

Prozedur 2:

--

Medizinische Kodierassistenten
Kodierung im stationären Bereich
Psychiatrie und Psychosomatik (4)

Fall 39

Ein Patient mit schwerer Intelligenzminderung und agitiert-aggressivem Verhalten wird nach mehreren Stürzen stationär aufgenommen. Es wird ein Kernspintomogramm des Schädels unter Narkose durchgeführt.

Prozedur 1:

--

Prozedur 2:

--

Fall 40

Ein Patient wird aufgrund einer schweren rezidivierenden depressiven Störung stationär behandelt. Als Nebendiagnose ist seit Jahren eine Psoriasis vom Plaque-Typ bekannt. Der Patient befindet sich 42 Tage in stationärer Behandlung. In diesem Behandlungszeitraum werden dem Patienten unter Einhaltung des bestehenden Therapieschemas zur Behandlung der Psoriasis dreimalig 40mg Adalimumab subkutan verabreicht.

Prozedur:

--